Порошок водорастворимый

Действующее вещество – Гентамицина сульфат.

Состав: в 1,0 г препарата содержится 100,0 мг гентамицина сульфата и наполнитель.

Гентафарм 10% применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами.

Вид животного: свиньи, молодняк КРС, птица.

Порядок применения препарата:

Телята – в первый день применяют в дозе 0,5 г препарата на 10 кг массы тела в два приема с интервалом 12 ч; в последующие 2-4 дня в дозе 0,4 г препарата на 10 кг массы тела один раз в сутки

Поросята -препарат при колибактериозе выпаивают с водой из расчета 11,0 г препарата на 100,0 л воды в течение 3 дней, при сальмонеллезе – 15,0 г препарата на 100,0 л воды в течение 4 дней, при кампилобактериозе и дизентерии 22,0 г препарата на 100,0 л воды в течение 5 дней. При приеме с кормом препарат задают в дозе 0,25 г на 10 кг массы тела, 2 раза в сутки в течение 3-5 дней.

Птица – выпаивают с водой из расчета 5 г препарата на 100 л воды в течение 5-7 дней

Препарат применяют внутрь индивидуально или групповым методом с кормами или водой в течение 3-7 дней

Лечебный раствор следует готовить непосредственно в день применения. При применении препарата с кормом рекомендуется применять дробное смешивание.

Убой животных на мясо разрешается через 10 суток, а птицы через 25 суток после последнего применения препарата.