

# Описание

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эндометрамаг - Грин.

Международное непатентованное наименование действующих веществ: интерферон, пропранолол.

2. Лекарственная форма: раствор для внутриматочного введения.

Эндометрамаг - Грин® содержит в 1 мл препарата в качестве действующих веществ интерферона - не менее 500000 (5·10<sup>5</sup>) международных единиц (МЕ), пропранолола гидрохлорида - 15 мг, а также вспомогательные вещества и воду для инъекций.

3. Эндометрамаг - Грин® фасуют по 1 л в полиэтиленовые канистры, которые закрывают резьбовыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждая единица фасовки снабжается инструкцией по применению.

4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 1 год с даты производства, после вскрытия флакона - 14 суток.

Запрещается использование препарата после окончания срока его годности.

5. Эндометрамаг - Грин® следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Эндометрамаг - Грин® - комбинированный препарат с противовирусным и иммуномодулирующим действием. Оказывает местное и системное действие.

Входящий в состав препарата интерферон альфа - 2b оказывает противовирусное, иммуномодулирующее, антипролиферативное действие. Противовирусный эффект опосредован активацией ряда внутриклеточных ферментов, ингибирующих репликацию вирусов. Иммуномодулирующее действие проявляется в первую очередь усилением клеточно - опосредованных реакций иммунной системы, что повышает эффективность иммунного ответа в отношении вирусов и внутриклеточных паразитов.

Антибактериальный эффект опосредован реакциями иммунной системы, усиливаемыми под влиянием интерферона.

При внутриматочном применении за счет высокой концентрации интерферона в очаге инфекции и фиксации на клетках слизистой оболочки матки достигается выраженный местный противовирусный, антипролиферативный эффект, при этом системное действие за счет низкой всасывающей способности слизистой оболочки матки незначительное.

Пропранолола гидрохлорид - неселективный бета - адреноблокатор, усиливает сократительную способность миометрия, что способствует более быстрому отделению последа и удалению содержимого из матки.

Препарат не оказывает прижигающего действия на слизистую оболочку матки и способствует регенерации эндометрия.

Компоненты препарата плохо всасываются через слизистую оболочку матки, что предотвращает их накопление в продуктах животноводства и молоке.

В рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не оказывает местно - раздражающего действия, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гепатотоксическим действием.

Эндометрамаг® - Грин по степени воздействия на организм согласно классификации ГОСТ 12. 1. 007 - 76 относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).

## • ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Эндометрамаг® - Грин применяют для лечения эндометрита у коров и профилактики послеродовых акушерских заболеваний.

9. Противопоказанием для применения является повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата.

10. Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Для лечения эндометрита препарат вводят внутриматочно в дозе 50 - 150 мл с помощью шприца Жанэ с интервалом 24 - 48 часов до клинического выздоровления. Курс лечения составляет 3 - 5 введений. При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение 1, 5 - 2, 0 минут.

Для профилактики послеродовых акушерских болезней препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 50 - 150 мл с помощью шприца Жанэ после отделения последа, абортов или оказания помощи при осложненных и патологических родах.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.
12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.
13. При случайном увеличении интервала между двумя введениями препарата, его следует ввести как можно скорее в предусмотренной дозировке.
14. При применении Эндометрамага - Грин® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций назначают симптоматическое лечение.
15. Не допускается одновременное применение Эндометрамага® - Грин с ксилазином, ксиланитом, рометаром, ромпуном. Допускается совместное применение с антибактериальными препаратами.
16. Молоко во время применения препарата и после можно использовать для пищевых целей без ограничений.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток после прекращения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, после термической обработки может быть использовано для кормления пушных зверей.

### **1. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

17. При работе с Эндометрамагом - Грин® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эндометрамагом - Грин®. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
19. Пустые канистры из - под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.