

## **Альвесол**

### **для лечения субклинического и острого катарального мастита у коров**

#### **СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА**

В 1000 мл раствора для инъекций: Allium sativum Ø – 0,3 мл, Lachesis mutus D4 – 0,1 мл, Plantago major Ø – 0,2 мл, Salvia officinalis Ø – 0,3 мл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат, натрия хлорид, натрия ацетата тригидрат, кислоту соляную, спирт этиловый 95%, полисорбат 80, воду для инъекций до 1000 мл. По внешнему виду представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. Препарат выпускают в виде стерильного раствора, расфасованного по 100 мл в стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон маркируют с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения лекарственного средства, названия и содержания действующих веществ, объема во флаконе, надписей «Для ветеринарного применения», «Стерильно», номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, номера государственной регистрации.

#### **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Альвесол обладает противовоспалительным действием при мастите и снижает количество соматических клеток в молоке. Компоненты, входящие в состав Альвесола, обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими (стимулируют фагоцитоз и продукцию эндогенного интерферона) свойствами, способствуют элиминации патогенной микрофлоры и регенерации эпителия молочной железы.

#### **ПОКАЗАНИЯ**

Назначают коровам при повышенном уровне соматических клеток; субклиническом мастите, для лечения острого мастита (на начальных стадиях или в составе комплексной терапии).

#### **ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Альвесол раствор для инъекций применяют коровам внутримышечно.

Для лечения субклинического мастита:

в дозе 5,0 мл на одно животное два раза в день, в течение 3 дней; или

в дозе 10,0 мл на животное один раз в день, в течение 3 дней.

Для лечения острого катарального мастита: в дозе 5,0 мл на одно животное два раза в день, в течение 4-5 дней.

#### **ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются.

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

#### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

При работе с Альвесолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре от 0 до 30 °С. Срок годности – 36 месяцев.