

# Чеми-спрей



**Чеми-спрей** - лекарственный препарат для лечения ран, заболеваний кожи и копыт у животных в форме суспензии для наружного применения.

**Состав:** Чеми-спрей в качестве действующих веществ содержит хлортетрациклин гидрохлорид - 2 г, генциан виолет - 0,5 г.

**Фармакологические свойства:** Чеми спрей относится к группе комбинированных антибактериальных препаратов для наружного применения. Обладает выраженными антибактериальными свойствами. Входящий в его состав хлортетрациклина гидрохлорид активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Streptococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Clostridium spp.*, а также риккетсий.

Механизм антибактериального действия **хлортетрациклина гидрохлорида** основан на подавлении белкового синтеза микробной клетки (блокада функции рибосом) и блокаде синтеза РНК.

**Генциан виолет** является антисептиком со слабым противомикробным и противогрибковым действием, который активен против некоторых грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus spp.*), а также патогенных дрожжей (*Candida spp.*).

**Показания к применению:** Чеми-спрей применяют местно всем видам сельскохозяйственных животных, собакам и кошкам для лечения ран хирургического и травматического происхождения, ссадин, царапин, поражений кожи и копыт при некробактериозе.

**Режим дозирования:** Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При лечении поражений в области головы следует предотвращать попадание препарата в глаза.

Перед применением препарата с обрабатываемой поверхности следует удалить загрязнения, некротизированные ткани, гной и раневой экссудат.

Чеми-спрей распыляют в течение 1-2 секунд с расстояния 15-20 см от пораженной поверхности. Обработку проводят один-три раза в сутки.

Продолжительность лечения зависит от тяжести и скорости заживления, но не должна превышать 10 дней.

**Противопоказания:** повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

**Побочные эффекты:** Побочных явлений и осложнений при применении Чеми-спрея в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не установлено. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

**Особые указания:** Взаимодействия с другими лекарственными препаратами не выявлено. Чеми-спрей при применении в соответствии с настоящей инструкцией не накапливается в продуктах животноводства.

Убой животных в период применения препарата разрешается проводить на общих основаниях. В случае вынужденного убоя обработанные препаратом участки кожи на туше следует удалить и утилизировать.

**Условия и сроки хранения:** Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов и источников возгорания отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 15°C до 20°C. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства.

**Стандартная упаковка:** алюминиевый баллон с распылительной головкой 200 мл.