

## ИНСТРУКЦИЯ

По применению **Мамифорта Секадо** для профилактики и лечения мастита у коров в сухостойный период.

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мамифорт Секадо (Mamifort Secado). Международное непатентованное наименование: ампициллин + клоксациллин.
  2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения. Мамифорт Секадо в качестве действующих веществ содержит (в 1 шприце): ампициллин (тригидрат) - 250 мг и клоксациллин в форме бензатиновой кислоты - 500 мг, а в качестве вспомогательных веществ - бутил гид рокситолуол (1,6 г), алюминия моностеарат (240 мг) и жидкий парафин (8 г).
- Лекарственный препарат расфасован в шприцы-дозаторы, которые упакованы в картонные коробки по 4 штуки или полиэтиленовые ведра по 48 штук.
3. Срок годности лекарственного препарата - 2 года со дня изготовления. Запрещается применять Мамифорт Секадо после истечения срока годности.
  4. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света и не доступном для посторонних лиц месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 4 до 25°C.
  5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, не доступных для детей.
  6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют с бытовыми отходами.

### II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Фармакотерапевтическая группа: антибактериальный комбинированный препарат для интрацистернального введения.
- Входящая в состав Мамифорта Секадо комбинация труднорастворимых солей полусинтетических пенициллинов - ампициллина и клоксациллина и специальная основа обеспечивают пролонгированное действие лекарственного препарата в течение 4 недель против возбудителей мастита, выделяемых из секрета вымени коров в сухостойный период, включая стрептококки, стафилококки, клостридии, в том числе штаммы, устойчивые к пенициллину! резистентность которых обусловлена Э-лактамазой.
- Бактерицидное действие ампициллина тригидрата и клоксациллина бензатина основано на ингибировании транспептидазы и карбоксипептидазы микроорганизмов, что препятствует синтезу клеточной стенки бактерий, приводит к нарушению осмотического баланса и гибели бактерий.
- Мамифорт Секадо по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего действия на ткани молочной железы.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Мамифорт Секадо применяют для профилактики и лечения мастита бактериальной этиологии у коров в сухостойный период.
9. Мамифорт Секадо противопоказан животным с гиперчувствительностью к одному из компонентов лекарственного препарата.
10. Мамифорт Секадо вводят коровам после последней дойки перед переводом в сухостойный период, но не позднее, чем за 42 дня до предполагаемого отела, однократно, интрацистернально; по 8 г (содержимое 1 шприца-дозатора) в каждую четверть вымени. Перед введением лекарственного препарата молоко из больных четвертей вымени выдаивают и утилизируют, сосок обрабатывают дезинфицирующим раствором. Канюлю инъектора помещают в канал соска и осторожно выдавливают содержимое в пораженную четверть вымени. Вынимают инъектор и пальцами пережимают сосок на 1 -2 минуты. Проводят легкий массаж соска для лучшего распределения препарата.
11. Симптомы передозировки не выявлены.
12. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства или другое симптоматическое лечение.
13. Мамифорт Секадо запрещается применять коровам в период лактации и менее чем за 42 дня до отела ввиду длительного выделения клоксациллина с молоком. В случае, если препарат был ошибочно введен лактирующим коровам, то молоко нельзя использовать в пищу в течение 46 суток.
14. Побочных явлений и осложнений при применении Мамифорта Секадо в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.

15. Мамифорт Секадо не следует назначать одновременно с другими антибактериальными препаратами.

16. В пищевых целях молоко разрешается использовать не ранее, чем через 120 часов после отела. Молоко, полученное после отела коров до истечения установленного срока, разрешается использовать после кипячения в корм животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего введения Мамифорта Секадо. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При применении Мамифорта Секадо необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами.

18. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом.

19. При попадании Мамифорта Секадо на кожу и слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством водопроводной воды.

Инструкция разработана фирмой «Laboratorios SYVAs.a.» (Испания) совместно с фирмой «Preston Vet Kft» (Венгрия).