

# АЙСИДИВИТ

Инструкция по применению Айсидивита для повышения резистентности, лечения и профилактики желудочно-кишечных, респираторных, гинекологических заболеваний и регуляции репродуктивных функций с/х животных и собак  
Утверждена Заместителем Руководителя Россельхознадзора РФ Власовым Н.А.  
Регистрационный номер в РОССИИ 77/32-2-6.8-3695 № ПВР-2-6.8/02406 от 29.06.2009  
Регистрационный номер в ГРУЗИИ № 000194 от 27.07.2011  
Регистрационный номер в КЫРГЫЗСТАНЕ РВ-2012-549 КР-№9817 от 10.10.2012  
Регистрационный номер в ТАДЖИКИСТАНЕ №115/09 от 24.12.2009  
Регистрационный номер в ТУРКМЕНИСТАНЕ №000009 от 21.02.2013  
Регистрационный номер в УЗБЕКИСТАНЕ ВП-2230-12 от 12.04.2012  
Регистрационный номер в УКРАИНЕ № АА-01691-01-10 от 28.10.2010

## **Раствор инъекционный для повышения резистентности, нормализации обмена веществ, лечения и профилактики желудочно-кишечных, респираторных, мочеполовых, гинекологических заболеваний и регуляции репродуктивных функций крупного, мелкого рогатого скота, свиней и собак.**

**СОСТАВ.** Айсидивит - раствор для инъекций, содержащий в 1 мл: АСД 2-Ф субстанцию-0,04 г, янтарную кислоту-0,05 г, витамин А -15000 ЕД, витамин Е-10 мг и вспомогательные вещества.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.** Препарат активизирует иммунную систему, обмен веществ в организме при различных заболеваниях. Айсидивит стимулирует моторную деятельность желудочно-кишечного тракта, мочеполовую и респираторную системы, секрецию пищеварительных желез, повышает активность тканевых ферментов, способствует ускорению роста и развития молодняка, а также повышению продуктивности сельскохозяйственных животных.

Препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

**ФОРМА ВЫПУСКА.** Препарат представляет собой прозрачную жидкость светложелтого цвета. Айсидивит выпускают в виде стерильного раствора, расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы, которые упаковывают в картонные коробки.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.** Айсидивит применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям и собакам с лечебной и профилактической целью для повышения резистентности, стимуляции роста и развития молодняка, при патологических состояниях, сопровождающихся снижением иммунореактивности организма, в том числе при нарушениях обмена веществ, болезнях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, дерматитах, экземах и длительно незаживающих ранах, в дозах, указанных в таблице.

Препарат вводят внутримышечно пять раз с интервалом 3 дня, кроме случаев, указанных ниже таблицы, в следующих дозах:

Крупному рогатому скоту массой 400-500 кг	10-15 мл	
Телятам	5-6 мл	
Овцам	2-4 мл	
Ягнятам, козлятам	1-1,5 мл	
Поросятам	1-2 мл	
Свиньям	2-4 мл	
Собакам	массой до 10 кг	0,2 мл
	от 10 до 30 кг	0,5 мл
	свыше 30 кг	1 мл

**При гинекологических заболеваниях:**

- **для стимуляции и нормализации половой функции** коров с гипофункцией яичников Айсидивит вводят за 30,25 и 20 дней до осеменения в дозе 10-15 мл на животное;
- **для повышения оплодотворяемости, профилактики эмбриональной смертности, сокращения сервис-периода** лекарственное средство вводят коровам в день осеменения, затем на 5 и 10 сутки после осеменения в дозе 10-15 мл на животное;
- **для профилактики послеродовых осложнений** (эндометритов, задержки последа) и гипоксии плода препарат вводят коровам в сухостойный период четырехкратно с интервалом 10 дней в дозе 10-15 мл на животное;
- **для восстановления процесса овуляции** у коров Айсидивит вводят на 5,10,15 сутки после отела в дозе 8-10 мл на животное;
- **для повышения жизнеспособности эмбрионов** у супоросных свиноматок препарат применяют на 7 и 12 сутки после осеменения в дозе 3 мл на животное; .....
- **для профилактики гипоксии плода** лекарственное средство применяют свиноматкам на 45, 70,85 дни супоросности в дозе 5 мл на животное.

Применение Айсидивита не исключает использование других лекарственных средств этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

**ХРАНЕНИЕ.** В закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Хранить в местах, недоступных для детей. Айсидивит не должен применяться по истечении срока годности.



Организация-производитель: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»  
Отзывы о препарате и заявки на его оптовые поставки просьба направлять по адресу:  
Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, тел.: (495) 648-26-26.  
Интернет: [www.vetmag.ru](http://www.vetmag.ru), e-mail: [help@vetmag.ru](mailto:help@vetmag.ru)  
Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).