

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата ветеринарного «НАСТОЙКА ЧЕМЕРИЦЫ»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настойка чемерицы (Tinctura Veratri).

1.2 Настойка представляет собой вытяжку из корневищ чемерицы на 70% спирте этиловом. Препарат представляет собой однородную прозрачную жидкость красновато-бурого цвета.

В настойке чемерицы содержится 0,1 % алкалоида протовератрина и другие алкалоиды (йервин, псевдойервин и др.), смолы, сахара, крахмал, дубильные вещества.

1.3 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50 и 100 мл.

1.4 Препарат хранят с предосторожностью (по списку Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до плюс 20°С.

Срок годности 3 (три) года от даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Настойка чемерицы относится к фармакотерапевтической группе: рвотные и руминаторные средства.

Препарат через 5-10 минут после приема внутрь рефлекторно раздражает чувствительные рецепторы слизистой оболочки преджелудков и желудка, усиливает моторику и секрецию преджелудков у жвачных животных, а у собак и свиней вызывает рвоту.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Настойку чемерицы применяют в качестве руминаторного средства при атонии, гипотонии и тимпании рубца у жвачных, в качестве рвотного средства для свиней и собак, а также для борьбы с эктопаразитами (блохами, вшами, клещами) у животных.

3.2 Настойку чемерицы применяют внутрь в следующих дозах:

— крупный рогатый скот: 5 – 12 мл на животное или (0,01 – 0,024 мл/кг массы тела);

— овцы и козы: 1 – 4 мл на животное или 0,04 – 0,08 мл/кг массы тела;

— свиньи: 1 – 2 мл на животное или 0,014 – 0,028 мл/кг массы тела;

— собаки: 0,05 – 2 мл на животное или 0,05 – 0,2 мл/кг массы тела.

Препарат вводят 1 — 2 раза в день до выздоровления.

В зависимости от вида животного препарат перед введением разбавляют водой в соотношении от 50 до 500 мл и задают внутрь с помощью резиновой бутылки.

3.3 Для борьбы с блохами, вшами, и клещами настойкой чемерицы в разведении водой 1:2 опрыскивают или смачивают спину животным.

3.4 Настойку чемерицы иногда вводят внутривенно (осторожно) жвачным животным при закупорке пищевода, атонии и гипотонии преджелудков, парезе мускулатуры рубца,

хронической тимпаниии рубца в следующих дозах (мл на животное): крупному рогатому скоту – 2,0 — 3,0; мелкому рогатому скоту – 0,5.

3.5 Противопоказана настойка чемерицы при индивидуальной непереносимости животными.

3.6 Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При передозировке препарата вводят 1% раствор атропина сульфата подкожно в дозе 0,3 — 1 мл на 10 кг массы тела и симптоматические средства.

3.7 Сведения о взаимодействии настойки чемерицы с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками отсутствуют.

3.8 Продукты животноводства во время и после применения настойки чемерицы используют без ограничений.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствия препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.