

Инструкция по применению Алюмиспрея для обработки ран у животных (Организация-производитель: ООО Фирма «БиоХимФарм», г. Владимир)

I. Общие сведения

Алюмиспрей (Alumispreum) - лекарственный препарат в форме раствора для наружного применения в аэрозольной упаковке, применяемый в качестве антисептического средства для животных.

Алюмиспрей содержит в 100 г в качестве действующего вещества алюминиевую пудру (алюминия окись) - 9,6 г, а в качестве вспомогательных средств - канифоль сосновую, клей БФ-6 и спирт этиловый.

Алюмиспрей по внешнему виду представляет собой жидкость серого цвета.

Выпускают Алюмиспрей расфасованным по 100 см³ в аэрозольные баллоны и по 30, 50 и 100 см³ в беспропеллентные флаконы с распылительными головками и защитными колпачками.

Каждую упаковку маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения, способа, применения и массы лекарственного средства в единице упаковки, названия и содержания действующего вещества, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписей «Стерильно», «Для животных», «Перед применением встряхнуть», номера государственной регистрации, информации о сертификации, обозначения ТУ и сопровождают инструкцией по применению.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя вдали от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 4 года со дня изготовления.

Алюмиспрей не должен применяться по истечении срока годности.

II. Фармакологические свойства

Алюминия окись в составе Алюмиспрея оказывает адсорбирующее и обволакивающее свойство и, таким образом, оказывает заживляющее действие на поврежденные ткани.

По степени воздействия на организм Алюмиспрей согласно ГОСТ 12.1.00776 относится к «веществам малоопасным» (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

Алюмиспрей применяют наружно для обработки ран у животных. Перед нанесением препарата проводят санитарную обработку раневой поверхности.

Препарат распыляют в течение 1-2 секунд с расстояния 15-20 см до поврежденной поверхности, 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней, нанося его ровным тонким слоем.

Алюмиспрей при применении в соответствии с настоящей инструкцией не вызывает у животных побочных явлений и осложнений.

Применение Алюмиспрея не исключает использования других лекарственных средств этиотропной и патогенетической терапии.

Противопоказаний к применению Алюмиспрея не установлено.

Продукцию животноводства во время и после применения Алюмиспрея разрешается использовать без ограничений. В случае вынужденного убоя животного обработанные Алюмиспреем участки туши зачищают и утилизируют.

IV. Меры личной профилактики

При проведении лечебных мероприятий с использованием Алюмиспрея следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Пустые флаконы из-под Алюмиспрея запрещается использовать для бытовых целей, их утилизируют с бытовыми отходами.

Алюмиспрей следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО Фирма «БиоХимФарм», г. Владимир.

Организация-производитель: фирма «БиоХимФарм», Россия, г. Владимир, ул. Лакина, 4. а/я 33

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».