

# Колимаст

**Упаковка:**

10 100  
мл мл

**Описание:**

Маслянистая суспензия светло-желтого цвета.

**Состав:**

Неомицина сульфат, вспомогательные вещества.

**Фармакологические свойства:**

Неомицин активен в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных аэробных микроорганизмов: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium diphtheriae*, *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Proteus* spp., *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Vibrio cholerae*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Haemophilus influenzae*.

**Показания к применению:**

Для лечения мастита у лактирующих коров.

**Способ применения и дозы:**

Вводят интрацистернально:

- при субклиническом, серозном и катаральном мастите по 5 мл один раз в сутки в течение 3-4 дней;
- при гнойно-катаральном мастите - первое введение 10 мл, далее по 5 мл с интервалом 24 часа в течение 5-6 дней.

**Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к аминогликозидам. Запрещается применять Колимаст одновременно с другими ото- и нефротоксичными препаратами (стрептомицином, мономицином, канамицином, гентамицином).

**Ограничения:**

В пищевых целях молоко используют не ранее, чем через 7 суток после последнего введения препарата при условии полного исчезновения признаков мастита, подтвержденных маститными тестами. Убой животных и использование мясопродуктов в пищу разрешается не ранее, чем через 7 суток после последнего введения препарата.

**Форма выпуска:**

Флакон 100 мл, шприц-дозатор 10 мл