Инструкция по применению витаминно-минерального препарата Элеовит для профилактики и лечения гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных

(Организация-разработчик: ООО «НПК «Асконт+», Московская область)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Элеовит (Eleovit).
Международное непатентованное наименование: витамины А, $Д_3$, Е, $К_3$, $В_1$, $В_2$, $В_6$, цианокобаламин, биотин, никотинамид, пантотеновая кислота, фолиевая кислота.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Элеовит в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: витамин А – 10000 МЕ, витамин $Д_3$ – 2000 МЕ, витамин Е –10 мг, витамин $К_3$ – 1 мг, витамин $В_1$ – 10 мг, витамин $В_2$ – 4 мг, витамин $В_6$ – 3 мг, цианокобаламин – 10 мкг, биотин – 10 мкг, никотинамид – 30 мг, пантотеновую кислоту – 20 г, фолиевую кислоту – 0,2 мг и вспомогательные вещества: гидролизат белка лактоальбумина – 0,2 г, глюкозу – 50 мг, воду для инъекции – до 1 мл.
По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую жидкость (допускается опалесценция) от светло-желтого до светло-коричневого цвета со специфическим запахом.
Максимально допустимые отклонения содержания витаминов не превышают 15%, по содержанию вспомогательных веществ – 10% от указанных количеств.

Выпускают лекарственный препарат в виде стерильного раствора по 5, 10, 20, 50 и 100 мл в темных стеклянных флаконах, соответствующей вместимости, герметично закрытых резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая упаковка снабжена инструкцией по применению.

Хранят Элеовит в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°С до 25°С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.
Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.
Элеовит следует хранить в местах, недоступных для детей.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: комбинированный витаминный препарат. Поливитамины.

Входящие в состав Элеовита поливитамины оказывают синергидное действие.
Витамин А регулирует функцию и регенерацию эпителиальных тканей, тем самым повышая защитную функцию организма животных.
Витамин $Д_3$ участвует в обмене кальция и фосфора, обладает противорахитическим действием.
Витамин Е, являясь сильным антиоксидантом, регулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает действие витаминов А и Д.
Витамины группы В играют важную роль в нормализации обмена веществ, регуляции нервных процессов.

По степени воздействия на организм Элеовит относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

Элеовит применяют с лечебной и профилактической целью сельскохозяйственным животным при гиповитаминозах и заболеваниях, развивающихся на их фоне (ксерофтальмии, рахите, остеомаляции, тетании), для повышения воспроизводительных функций, а также как вспомогательное средство при лечении дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалениях слизистых оболочек.

Противопоказанием к применению Элеовита является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Элеовит вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи, смещая кожу в месте укола в сторону во избежание вытекания раствора.
В зимнее время перед применением лекарственное средство следует подогреть на водяной бане до комнатной температуры.

С профилактической целью (при стрессах, в период интенсивных нагрузок, высокой продуктивности, беременным животным, при нарушениях воспроизводительной функции, отставании молодняка в росте и развитии, в период вакцинации, дегельминтизации, выздоровлений после перенесенных заболеваний), Элеовит вводят один раз в 2-3 недели.

С лечебной целью лекарственный препарат вводят один раз в 7-15 дней в дозах:

Вид животных	**Возрастная и технологическая группа**	**Количество мл на голову в сутки**
Крупный рогатый скот	Взрослое поголовье	5-6
	Молодняк (с 6 до 12 месячного возраста)	2-3
Лошади	Взрослое поголовье	3-5
	Молодняк (с 6 до 12 месячного возраста)	2-3
Свиньи	Взрослое поголовье	2
	Поросята-отъемыши	1,5
	Поросята-сосуны	1
	Новорожденные поросята	0,5
Овцы, козы	Взрослое поголовье	1-2
	Ягнята, козлята	1

Супоросным свиноматкам Элеовит вводят за 1,5-2,0 месяца до опороса.

Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.
Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В месте инъекции препарата может наблюдаться изменение окраски кожи, самопроизвольно исчезающее в течение 10-14 дней.
При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии, применение Элеовита прекращают и животному назначают антигистаминные лекарственные препараты и средства симптоматической терапии.

Элеовит совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.

Продукцию от животных после применения Элеовита можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Элеовитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Элеовитом. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, Серпуховский р-н, п. Оболенск, ул. Строителей, корпус 2.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Элеовита, утвержденная Россельхознадзором 11 сентября 2013 г.