

Мастисан



Инструкция по применению препарата Мастисан для лечения мастита у лактирующих коров

(организация-разработчик: ЗАО «Нита-Фарм», г. Саратов)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Мастисан (Mastisan).

Международное непатентованное наименование: пенициллин, стрептомицин и сульфадимезин.

Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения, Мастисан в 1 мл в качестве действующих веществ содержит 20 мг стрептомицина сульфата, 20000 ЕД бензилпенициллина натриевой или калиевой соли, 70 мг сульфадимезина, а в качестве вспомогательных компонентов рафинированное подсолнечное масло до 1 мл.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой маслянистую, гомогенную сметанообразную суспензию от белого до кремового цвета.

Выпускают Мастисан расфасованным по 20, 50, 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 20°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 18 месяцев со дня производства, после вскрытия флакона - 60 суток.

Запрещается применять Мастисан по истечении срока годности.

Мастисан следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Мастисан относится к фармакотерапевтической группе противомикробных препаратов системного действия.

Обладает широким спектром антибактериального действия, обусловленным входящими в состав препарата компонентами, проявляющими синергизм в отношении отдельных микроорганизмов.

Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, протей, кишечная палочка, сальмонеллы и др.).

Препарат в рекомендуемых дозах не оказывает сенсibilизирующего, местнораздражающего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.

Выводится из организма с молоком.

По степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

Препарат применяют для лечения мастита у лактирующих коров.

Противопоказаний к применению Мастисана согласно настоящей инструкции не установлено.

Перед применением препарата из больной четверти вымени сдаивают и утилизируют молоко, дезинфицируют сосок.

Содержимое флакона перед использованием нагревают до 36-39°C, тщательно встряхивают до получения равномерной взвеси. Лекарственный препарат набирают из флакона стерильным шприцем в количестве 5-20 мл, плотно прижимают канюлю шприца к отверстию соскового канала и вводят осторожным нажатием на поршень шприца в сосковую цистерну вымени. После введения проводят лёгкий массаж соска поражённой четверти вымени снизу вверх. В зависимости от тяжести воспалительного процесса Мастисан вводят в дозе 5-20 мл с интервалом 24 часа в течение 5-8 дней, а при гнойном и катарально-гнойном маститах до 10 дней.

При применении препарата согласно инструкции симптомов передозировки не установлено. В случае передозировки животному необходимо назначить дезинтоксикационную и симптоматическую терапию.

Особенностей действия препарата при первом введении или при его отмене не выявлено.

При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата необходимо возобновить применение в предусмотренной дозировке и схеме. Не следует вводить двойные дозы для компенсации пропущенных.

При применении в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

Применение Мастисана не исключает использование других лекарственных препаратов, за исключением вводимых интрацистернально.

Мясо животных, убитых во время лечения Мастисаном, используют на общих основаниях, за исключением вымени, которое бракуют. В случае невозможности выбраковки вымени, при вынужденном убое животных в процессе терапии Мастисаном и до истечения 3 суток после последнего применения препарата, мясо может быть использовано в корм плотоядным животным. Молоко, полученное из поражённых долей вымени животного во время лечения и в течение 3 суток после последнего введения препарата, сдаивают в отдельную посуду, обеззараживают и утилизируют, а из здоровых долей вымени скармливают животным после кипячения. Использование в пищу людям молока допускается через 3 суток после последнего введения препарата при условии полного исчезновения клинических признаков мастита, подтвержденных данными бактериологического и других лабораторных исследований.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Мастисаном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мастисаном. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: ЗАО «Нита-Фарм»; 410010, г. Саратов ул. Осипова, д.1.

Адрес места производства: 410010, г. Саратов ул. Осипова, д. 1.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мастисана-А, утвержденная Россельхознадзором 30 декабря 2005 года.