

Мамифорт шприц, СИВА, Испания (1 шт-10 мл)

Инструкция по применению Мамифорт шприца

Внутривымянная суспензия для лечения маститов у лактирующих коров, овец и коз. 8 мл суспензии содержат 75 мг ампициллина натриевой соли и 200 мг клоксациллина натриевой соли.

Назначение: Лечение маститов у коров, овец и коз в период лактации.

Биолигические свойства: МАМИФОРТ — это комбинация полусинтетических пенициллинов, сочетание которых позволяет препарату эффективно воздействовать на большинство возбудителей мастита, таких как стрептококки, стафилококки, *E. coli*, коринебактерии и арканобактерии. Местное применение Мамифорта позволяет достичь бактерицидных концентраций препарата в пораженной молочной железе, не вызывая неблагоприятной реакции ее тканей.

Дозировка и способ применения: В пораженную долю вымени вводят суспензию из одного инъектора. Перед применением препарата тщательно выдаивают молоко. Доза для коров — 1 инъектор, для овец и коз — ½ инъектора. Обработку повторяют той же дозой препарата через 12 часов. Полный курс лечения — 3 инъектора.

Противопоказания: Препарат противопоказан животным с гиперчувствительностью к антибиотикам пенициллинового ряда.

Форма выпуска: Инъекторы по 10 мл. Упакованы в пластиковые банки по 48 шприцов.

Хранение: Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 4 до 25 0С.

Примечания: Молоко в период лечения и в течение 3 суток после последнего применения препарата должно быть подвергнуто термической обработке и может быть использовано для кормления молодняка. В пищу людям молоко разрешено использовать через 3 суток (72 часа) после последнего применения препарата.

Убой на мясо можно проводить через 7 дней после окончания лечения.

Производитель: «СИВА Лаборатория С. А.» (SYVA Laboratorios S.A), Испания

Упаковка: 48 шприц-туб по 10 мл

Единица отпуска товара: 1 шприц 10 мл