

Крысиная смерть - средство родентицидное для уничтожения грызунов, является готовой к применению пищевой приманкой синего цвета в форме тесто-брикета.

СОСТАВ

ДВ: бромадиолон - 0,005%, битрекс (горечь), масло растительное, краситель, технический или растительные жиры, пищевой наполнитель (мука, зерно) до 100%.

СВОЙСТВА

По параметрам острой токсичности при однократном введении в желудок и нанесении на кожу средство относится к 4 классу мало опасных веществ согласно Классификации токсичности и опасности родентицидов и Классификации ГОСТ 12.1.007-76. По степени воздействия на организм теплокровных по лимитирующему показателю токсичности для родентицидов - кумуляции (усиление действия ядов при их повторных введениях в одних и тех же дозах), состав средства относится к I классу чрезвычайно опасных по Классификации токсичности и опасности родентицидов. Раздражает слизистые оболочки глаз.

ПДК бромадиолона в воздухе рабочей зоны 0,01 мг/м³ (аэрозоль).

НАЗНАЧЕНИЕ

Родентицидное средство предназначено для уничтожения серых (черных) крыс, домовых мышей, обыкновенных полевков и других грызунов аналогичного образа питания, размножения, местообитания на застроенных и незастроенных территориях населенных пунктов, на объектах различных категорий, включая жилые дома, пищевые, детские, лечебные (в местах недоступных детям или пациентам) организации, нежилые сухие и влажные помещения, подземные сооружения, подвалы, погреба, влажные места, природные очаги инфекций, специалистами организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью и населением в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовую приманку в фильтр-пакетиках раскладывают в местах обитания серых крыс, домовых мышей, обыкновенных полевков. Если средство упаковано в шприцы или флаконы, то оно выдавливается на подложку из плотной бумаги, полиэтилена, пластика или на картонные, или пластиковые тарелки по 5 г для мышей или полевков, либо по 10 г для крыс. В помещениях ёмкости с приманкой размещают на путях перемещения грызунов и прежде всего в углах, вдоль стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор.

Раскладывать приманку можно и в сухие и во влажные места.

Расстояние между местами раскладки подложек с приманкой варьирует от 2м до 10м, в зависимости от площади помещения, а также от вида и численности грызунов. При высокой численности грызунов приманку раскладывают чаще (1-3 м) небольшими порциями по 5-10г на точку раскладки.

Поедаемость и состояние разложенной приманки контролируют после первой раскладки через 2 дня. Затем, один раз в неделю контролируют её состояние. При этом порции средства заменяют новыми по мере поедания или загрязнения. Контроль и раскладку средства прекращают, если оно повсеместно остается нетронутым в течение продолжительного времени, что указывает на отсутствие грызунов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В соответствии с (СП) 3.5.3. 3223-14 к работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, инструктаж и не имеющие медицинских противопоказаний.

Работу по раскладке или фасовке средства следует проводить в спецодежде (халат или комбинезон из пылезащитной ткани, шапочка, спецобувь), а также с использованием средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки). Не допускать попадания средства на кожу, в рот и глаза: при работе со средством запрещается курить, пить и принимать пищу, после окончания работы необходимо вымыть руки теплой водой с мылом; руководство и персонал обрабатываемого объекта должны быть проинформированы о наличии на объекте родентицида, степени его токсичности и необходимых мерах безопасности; средство в местах его применения и хранения должно быть недоступно детям и домашним животным; раскладывать средство следует в приспособленные емкости (стационарные приманочные станции, дренажные трубы, лотки, подложки или в специальные контейнеры), исключающие разнос грызунами и его попадание в пищевые продукты или предметы быта; емкости для раскладки средства нумеруют, что позволяет их учитывать и контролировать; тара и остатки непригодной для поедания приманки утилизируются по завершении дератизационных мероприятий.

При обработке детских, лечебных, пищевых объектов соблюдать особые меры предосторожности: раскладывать приманку только в местах, где не бывает детей; размещать приманки только в емкостях, исключающих разнос яда зверьками и его попадание в пищевые продукты, на медикаменты и предметы быта.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в невскрытой упаковке, в сухом и хорошо вентилируемом, крытом складском помещении отдельно от пищевых продуктов, кормов и фуража, а также химических веществ, имеющих резкий запах при температуре от минус 20° до плюс 30°С. Срок годности родентицидного средства 3 года (36 месяцев) в невскрытой упаковке производителя.

УПАКОВКА

Средство фасуют в пакеты по 200г.