

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Йодсодержащий препарат, действующим веществом которого является калия йодид. Выпускают в форме таблеток белого цвета. В одной таблетке массой 0,1 г содержится 0,003 г калия йодида, а в таблетке массой 0,2 г – 0,006 г. Расфасованы в банки по 1000 штук.

ПОКАЗАНИЯ

Профилактика и лечение йодной недостаточности и заболеваний развивающихся на их фоне, у крупного рогатого скота в зонах с недостаточным содержанием йода в почвах и кормах.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат кайод не содержит свободного йода, и поэтому не действует раздражающе на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Калий йодид хорошо всасывается и изменяется с образованием йода; при этом йодиды резорбтивно действуют так же, как и йод. Йод участвует в обмене веществ в организме животных как составляющая часть гормона щитовидной железы, способствует ферментообразованию, поддерживает защитные реакции организма, ускоряет образование новых клеток, благоприятно влияет на развитие плода. Использование препарата способствует профилактике и лечению энзоотического зоба и других заболеваний, связанных с недостатком йода, что ведет к повышению продуктивности и сохранности животных.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат с профилактической целью задают животным ежедневно в следующих дозах:

Крупному рогатому скоту на откорме.

Молодняку массой тела до 300 кг – 1 таб. 0,1 г или 0,5 таб. 0,2 г;

молодняку массой тела более 300 кг – 2 таб. 0,1 г или 1 таб. 0,2 г.

Взрослым животным 3-4 таб. 0,1 г или 1,5 – 2 таб. 0,2 г.

Быкам-производителям на каждые 200 кг массы тела – 1 таб. 0,1 г или 0,5 таб. 0,2 г.

Нетелям 1-2 таб. 0,1 г или 0,5-1 таб. 0,2 г.

Первотелкам 2-3 таб. 0,1 г или 1-1,5 таб. 0,2 г.

Молочным коровам (количество таблеток в сутки на голову).

С 3-го месяца лактации до сухостоя:

Удой 2000-3000 л 1-2 таб.

Удой 3000-4000 л 2-3 таб.

Удой 4000-5000 л 3-4 таб.

Удой 5000-6000 л 4-5 таб.

В период сухостоя:

Удой 2000-3000 л 0,5-1 таб. по 0,2 г

Удой 3000-4000 л 1-1,5 таб. по 0,2 г

Удой 4000-5000 л 1,5-2 таб. по 0,2 г

Удой 5000-6000 л 2-2,5 таб. по 0,2 г

Первый и второй месяц лактации:

Удой 2000-3000 л 2-3 таб. по 0,1 г

Удой 3000-4000 л 3-4 таб. по 0,1 г

Удой 4000-5000 л 4-5 таб. по 0,1 г

Удой 5000-6000 л 5-6 таб. по 0,1 г

Удой 2000-3000 л 1-1,5 таб. по 0,2 г

Удой 3000-4000 л 1,5-2 таб. по 0,2 г

Удой 4000-5000 л 2-2,5 таб. по 0,2 г

Удой 5000-6000 л 2,5-3 таб. по 0,2 г

В лечебных целях препарат назначают по показаниям в тех же дозах и дают до исчезновения клинических признаков заболевания.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В рекомендуемых дозах не наблюдаются.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не установлены.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Животноводческую продукцию после применения препарата можно использовать без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В плотно закрытой таре в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Срок годности – 2 года.