

Описание

Лацилин (Lacylin) — лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное для лечения послеродовых осложнений у коров. По внешнему виду представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Состав

Содержит в качестве действующих веществ гомеопатические субстанции: 4%, Pulsatilla vulgaris D3 (прострел обыкновенный), 4% Secale cornutum D4 (спорынья пурпурная), 4% Licopodium clavatum D4 (плаун булавовидный), 4% Lachesis mutus D10 (яд змеи сурукуку), 4% Acidum Nitricum D6 (кислота азотная) и вспомогательный компонент: натрия хлорида изотонический 0,9% раствор для инъекций.

Фасовка

Стеклянные флаконы по 100 мл.

Фармакологические свойства

Активные компоненты Pulsatilla vulgaris, Secale cornutum, Lachesis mutus и Acidum Nitricum, входящие в состав Лацилина обладают синергетическим стимулирующим действием на сократительную функцию миометрия и оказывают противовоспалительный эффект. Lachesis mutus стимулирует иммунитет и усиливает бактериостатическое действие маточной слизи: Licopodium clavatum обладает выраженным антитоксическим действием.

По степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывает местнораздражающего, алергизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия.

Показания к применению

Препарат назначают коровам для лечения послеродовых осложнений, включая катаральные, гнойно-катаральные и субклинические эндометриты, субинволюцию матки.

Способ применения и дозы

Лацилин применяют коровам, начиная с 8-10 дня после отела, внутримышечно в дозе 5 мл на животное один раз в сутки:

- при субинволюции матки — 3-4-кратно с интервалом 24 часа;
- в комплексной терапии острого и хронического катарального эндометрита — 4-кратно с интервалом 2-3 дня;
- в комплексной терапии острого гнойно-катарального эндометрита — 5-7 раз с интервалом 24 часа.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Применение Лацилина не исключает использование средств специфической и патогенетической терапии.

Побочные явления

Побочных явлений и осложнений при применении препарата не установлено.

Период ожидания

Продукцию животноводства в период лечения и после последнего применения разрешается использовать без ограничений.

Меры личной профилактики

Следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Условия хранения

Хранят лекарственное средство в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, в местах, недоступных для детей при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения — 24 месяца со дня изготовления, после вскрытия флакона не более 48 часов. По истечении срока годности не использовать.

Не использованный в течение 48 часов Лацилин, подлежит обеззараживанию кипячением в течение 20 минут с последующей утилизацией.