

**Инструкция по применению препарата Террамицин Аэрозоль Спрей  
для лечения ран, заболеваний кожи и копыт у животных  
(организация-разработчик компания «Zoetis Inc», США)**

## **I. Общие сведения**

Торговое наименование лекарственного препарата: Террамицин Аэрозоль Спрей (Terramycin Aerosol Spray)

Международное непатентованное наименование: окситетрациклин.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Террамицин Спрей в одном баллоне содержит в качестве действующего вещества окситетрациклина гидрохлорид - 4.0 г, а в качестве вспомогательных веществ изопропиловый спирт-35,52 г, полисорбат 80-0,20 г, пейтент голубой V-0,20 г и n-бутан - 62,8 г.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой раствор синего цвета.

Препарат выпускают расфасованным по 150 мл в алюминиевых баллонах вместимостью 210 мл, снабженных распылительными головками, специальными мерными клапанами и колпачками.

Террамицин спрей хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 15 °С до 25 °С. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения составляет 2 года с даты производства.

Запрещается применять Террамицин Спрей после истечения срока годности.

Террамицин Аэрозоль Спрей следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

## **II. Фармакологические свойства**

Террамицин спрей относится к группе антибактериальных препаратов группы тетрациклинов.

**Окситетрациклин** - действующее вещество Террамицина - обладает широким спектром действия в отношении многих видов грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих кожные инфекции, в том числе *Fusobacterium necroforum*.

Механизм бактериостатического действия окситетрациклина основан на подавлении белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне. При наружном применении лекарственный препарат не адсорбируется.

Террамицин Аэрозоль спрей по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

## **III. Порядок применения**

Террамицин Спрей применяют самостоятельно или в составе комплексной терапии крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, лошадям, собакам, кошкам, кроликам для лечения:

- заболеваний кожи, копытец и межкопытцевой щели бактериальной этиологии (включая хирургические раны, раны травматического происхождения, ссадины, царапины)
- некробактериоза крупного рогатого скота и овец

Лекарственный препарат запрещается применять животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к антибиотикам тетрациклиновой группы.

Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабатываемую поверхность от гноя, раневого экссудата, некротизированных тканей, удалить шерсть.

Перед употреблением препарат необходимо хорошо встряхнуть и распылять с расстояния 18-20 см от пораженного участка в течение 2-3 секунд.

При необходимости повторную обработку проводят каждые 7 дней до полного излечения, но не более 4 раз. В случаях глубоких и инфицированных ран, местное лечение рекомендуется сочетать с комплексной терапией.

Симптомы передозировки не установлены.

Особенностей действия при первом применении и отмене Террамицина Аэрозоля Спрея не выявлено. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты или другое симптоматическое лечение.

В случае пропуска одной дозы курс лечения следует возобновить в предусмотренных инструкцией дозировках и схеме применения.

При применении Террамицина Аэрозоль Спрея в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

Применение Террамицина Аэрозоль Спрея не исключает использования других лекарственных препаратов специфической и симптоматической терапии.

Убой животных в период применения препарата проводят без ограничений.

#### **IV. Меры личной профилактики**

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения. При работе с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Террамицином. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: " IGS Aerosol GmbH", Im Hemmet 1, 79664 Wehr/ Baden. Германия

Инструкция разработана компанией «Zoetis Inc.» (100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey, 07932 USA) совместно с ООО «Зоэтис».

Адрес ООО «Зоэтис» в РФ: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению лекарственного препарата Террамицин Аэрозоль Спрей, утверждённая Россельхознадзором 5 апреля 2013 года.